

Målgruppebeskrivelse børn og unge - Tourettes syndrom (ofte invalideret på funktionsniveauet)

CGI	Beskrivelse
1 ikke syg	
2 måske mental syg	<ul style="list-style-type: none"> Ikke beskrevet mistanke om eller lette symptomer på tics <p><i>Tilbagevisning med anbefaling om støtteforanstaltninger i primær regi</i></p>
3 syg i mild grad	<ul style="list-style-type: none"> Mistanke om eller lette/moderate symptomer på tics Ikke forsøgt sufficente tiltag i primær regi, både i fht. tics og i fht. evt. øvrige vanskeligheder (indlæring, sociale, ADHD/ASD, mental retardering) <p><i>Tilbagevisning med anbefaling om støtteforanstaltninger i primær regi</i></p>
4 syg moderat grad	<ul style="list-style-type: none"> Beskrivne moderate tics eller Tourettes syndrom af moderat grad (primær lidelse) + mindst en af nedenstående <ul style="list-style-type: none"> Funktionshæmning som er tydelig i form af somatiske gener, skolemæssige konsekvenser eller svær forpinthed Tilbagefald hos kendt patient med tidligere god effekt af behandling i BUA mhp. booster-behandling. Hvis der er anbefalet støtteforanstaltninger i primær ved afslutning, skal disse være forsøgt.
5 syg i udtalt grad	<ul style="list-style-type: none"> Svære tics/Tourette i form af udtalte tics (hyppighed, inddrager mange muskelgrupper, voldsomme tics) medførende <ul style="list-style-type: none"> Svær funktionshæmning (alvorlige somatiske gener, skolegang truet, svært forpint) Ved komorbiditet (ADHD/ADD, psykose, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, mental retardering med betydelig påvirkning af adfærden) skal der være iværksat behandling for disse tilstande først. Funktionshæmningen skal være tydelig i form af somatiske gener, skolemæssige konsekvenser Manglende/ikke tilstrækkeligt respons på psykosocial intervention.
6 syg i svær grad	<ul style="list-style-type: none"> Meget svære tics/Tourette i form af svær påvirkning af funktionsniveauet, skolegang ikke mulig, meget svære somatiske gener eller svært komplicerende komorbiditet (forsøgt adækvat behandlet) Manglende/ikke tilstrækkeligt respons på psykosocial intervention
6 syg i svær grad – mental retardering	<ul style="list-style-type: none"> Kendt med mental retardering og psykiatrisk sygdom samt væsentlig påvirkning af adfærd Svær mental retardering IQ <34 med mistanke om psykiatrisk sygdom Evt. suicidalrisiko Institutionsplacerede børn og unge med MR og psykiatrisk sygdom