

Målgruppebeskrivelse for integreret dobbeltdiagnosebehandling i Region Midtjylland

Bilag 1: Målgruppebeskrivelse – kriterier for psykiatrisk lidelse

Patienten skal have moderat til svær behandelig psykisk lidelse eller stærk mistanke herom. Psykiatrisk lidelse svarende til psykiatriens målgruppe - moderat til svær grad: **CGI-score 5-7 (Fraset Bipolar og F2, CGI=4-7)**

Diagnose	Tillægskriterier (psykiatriske)	Sæt kryds
F1 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer	Moderat / svær grad *Kun stofudløst psykose	
F2 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, akutte og forbigående psykotiske tilstande samt skizo-affektive sindslidelser	Moderat / svær grad	
F3 Affektive sindslidelser	Moderat / svær grad	
F4 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer (Angst, PTSD, OCD)	Moderat / svær grad	
F5 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer	Moderat / svær grad *Kun F50 - spiseforstyrrelse	
F6 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen	Moderat / svær grad *Ved dyssocial personlighedsstruktur skal der være samtidig behandelig psykiatrisk komorbiditet (undtaget F10).	
F8 Psykiske udviklingsforstyrrelser	Moderat / svær grad + samtidig behandelig psykiatrisk komorbiditet (undtaget F10).	
F9 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller adolescens	Moderat / svær grad + samtidig behandelig psykiatrisk komorbiditet (undtaget F10).	
Ved stærk mistanke eller manglende udredning		
Symptomer på svær til moderat lidelse svarende til ovenstående diagnoser (forud for rusmiddelforbrug)		
Hvis symptomer rækker ud over det der kan forklares af rusmiddelforbruget alene		

****Behandlingsmulighederne må ikke tidligere være vurderet udtømte, med mindre der er sket væsentlige ændringer, fx mistanke om/tilkommen anden psykiatrisk lidelse eller social situation, der giver nye behandlingsmuligheder. Dette er også gældende for patienter der tidligere har været i behandling i det integrerede tilbud (op til 1 år) og er afsluttet på grund af manglende bedring. For at patienten kan betragtes som inden for målgruppen, **skal mindst én af ovennævnte diagnoser + tillægskriterier være til stede**, eller begge kriterier for stærk mistanke.**

Bilag 2: Målgruppebeskrivelse – kriterier for funktionsevne

Funktionsevnen er påvirket i en sådan grad, og den enkeltes hverdag er så kompleks og kaotisk, at patienten ikke vurderes at kunne følge eller profitere af behandling i parallelt/koordineret behandlingstilbud.

Kriterier for nedsat funktionsevne	Sæt kryds
Samlet nedsat funktionsevne svarende til en GAF-score 1-40	
Autonomi, egenomsorg og bo evne	
Modtager eller har behov for støtte/hjælp til at udføre daglige gøremål (indkøb, rengøring, madlavning osv.)	
Modtager eller har behov for støtte/hjælp til at følge somatisk behandling	
Modtager eller har behov for støtte/hjælp til at opretholde personlig hygiejne	
Modtager eller har behov for støtte/hjælp til at klare sig i egen bolig	
Kan ikke varetage egen sikkerhed eller tage vare på kæledyr, børn mv.	
Hjemløs eller funktionel hjemløs (mange flytninger)	
Kan ikke håndtere egen økonomi	
Erhverv og uddannelse	
Kan ikke fungere på arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner	
Kan ikke fuldføre eller overkomme opgaver og/eller krav fra det ordinære arbejdsmarked eller uddannelsessystem	
Fritid	
Har mistet lyst og interesse for hobbyer og fritidsinteresser	
Kan ikke overskue hobbyer og fritidsinteresser	
Kognitivt	
Kan ikke længere tilegne sig ny viden eller huske informationer og aftaler	
Kan ikke længere finde løsninger på problemer, heller ikke oplagte løsninger på lette eller kendte problemstillinger	
Kan ikke længere fastholde koncentrationen til fx at læse eller se TV/serier	
Relationer	
Evner ikke at opsøge eller fastholde relationer uden for rusmiddelmiljøet/kriminelt miljø	
Er ikke i stand til at forsvare egne interesser og kan være passiv eller uden spontanitet i kontakten med andre	
Trækker sig fra venskaber og familie	
Har mange konflikter med andre mennesker i sin hverdag	

For at patienten kan betragtes som inden for målgruppen, bør **mindst 12 af ovennævnte 19 kriterier være opfyldt**. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der foretages en individuel vurdering af de enkelte kriteriers tyngde i samspil med patientens psykiatriske problemstilling og rusmiddelproblematikken. Ved behov for individuel vurdering bør der især lægges vægt på tyngden af kriterierne under **autonomi, egenomsorg og bo evne**.

Bilag 3: Målgruppebeskrivelse – kriterier for rusmiddelbrug

Patienten har et vedvarende og skadeligt brug af rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for patienten selv og/eller nærtstående personer. Skaderne vedrører patientens psykiske, fysiske og sociale funktion

Kriterier for rusmiddelproblematik	Sæt kryds
AUDIT score: 16-19 tyder på skadeligt brug, 20+ tyder på afhængighed	
DUDIT score: 25+ tyder på afhængighed	
Rusmiddelforbrug der er til hindre for udredning og behandling af psykiatrisk lidelse inden for målgruppen	
Kendt afhængighed – inden for de seneste 12 mdr.	
Skadeligt brug/afhængighed jf. ICD-10	
Forbrugsmønstre	
Patienten rapporterer om risikabel indtagelsesvej af rusmidler	
Patienten rapporterer om øget eksperimenteren med nye/flere rusmidler end det kendte/vanlige	
Patienten udviser ukontrolleret og ukritisk indtag (fx tilfælde af overdoser)	
Patienten har været indlagt med intoksikation inden for de seneste 12 mdr.	
Patienten opsøger kriminalitet eller prostitution for at opretholde rusmiddelforbruget	
Patienten har kendt somatisk lidelse afledt af rusmiddelforbrug	

For at patienten kan betragtes som inden for målgruppen, bør **mindst 1 af kriterierne under "Kriterier for rusmiddelproblematik"** være opfyldt. Såfremt patienten ellers opfylder kriterierne for stærkt nedsat funktionsevne, er forbrugsmønstret ikke afgørende for at inkludere patienten i målgruppen. Forbrugsmønstret kan dog være med til at beskrive patientens samlede tilstand. Rusmiddelforbruget skal dog i høj grad vurderes og ses i sammenhæng med patientens psykiatriske problemstilling og funktionsevne.

Bilag 4: Målgruppebeskrivelse – kriterier for overgang til koordineret behandling

Kriterier for overgang til koordineret behandling	Sæt kryds
Kriterier for bedring af psykiatrisk lidelse	
Patienten er udredt for sin psykiatriske lidelse	
Patientens psykiatriske problemstilling er klart defineret	
Patientens psykiatriske problemstilling er stabil eller i bedring	
Kriterier for bedring af funktionsevnen	
Der er overblik over patientens netværk/relevante parter	
Patientens bo evne er stabiliseret eller i bedring	
Der er foretaget afklaring af forsørgelsesgrundlag	
Der er iværksat aftaler om støtte til patientens økonomi	
Patienten rapporterer en oplevelse af bedring ift. relationer, hobbyer, mm.	
Somatisk tilstand er afklaret og relevant behandling er tilbudt eller opstartet	
Evt. fortsat behov for støtte til fremmøde, men uden opsøgende indsats fra psykiatrien ift. rusmiddelbehandlingen	
Kriterier for bedring af rusmiddelproblematikken	
Stabiliseret eller reduceret rusmiddelforbrug	

For at patienten kan betragtes som inden for målgruppen til at overgå til koordineret behandling, **bør mindst 1 af kriterierne under "Kriterier for bedring af psykiatrisk lidelse", samt mindst 4 af kriterier under "Kriterier for bedring af funktionsevnen" og kriteriet under "Kriterier for bedring af rusmiddelproblematikken" være opfyldt.** Overgangen iværksættes, når der har været en vedvarende forbedring af symptomer i minimum 3 måneder og/eller når behandlingsplanens mål er opnået, eller tæt på at være opnået.